

撲咳喘吸入液 2.5 公絲/公撮

衛署藥輸字第 017214 號

Bricanyl® Solution For Nebulizing 2.5mg/ml

Single dose plastic units, 2ml

Terbutaline sulfate

【使用方法】：

取一單一劑量，旋轉上端翼形設計（如圖示），即可開封。然後將該製劑擠入噴霧器的貯存槽，可維持 24 小時穩定備用。

單一劑量開封後逾三個月，不得繼續使用。

【注意】：

本製劑非注射用，只適用於呼吸器或噴霧器。

【組成】：

每公撮含：Terbutaline sulfate 2.5mg

【特性】：

Terbutaline 是一種選擇性腎上腺₂感受體刺激劑，作用時針對支氣管肌肉，₂刺激劑能舒緩支氣管平滑肌，改進膿性粘液之運送，同時亦可改進粘膜纖毛的異物清除及同系肌肉的緩解。

用撲咳喘吸入液治療後，Terbutaline 可經由血液深入身體週邊組織，其由體內排除之半衰期約為 15 小時，惟其投與間隔仍應斟酌縮短，以維持 Terbutaline 代謝末期之血中濃度在治療範圍內。

Bricanyl Solution for Nebulizing 可用於有或無輔助呼吸的噴霧器，對於急性或亞急性發作的病患，可彌補傳統式吸入器不理想之處，且適用於嚴重氣管阻塞的維護醫療。

Bricanyl Solution for Nebulizing 2.5mg/ml 使用方便，無須稀釋具等張性，不含防腐劑。

藥理治療分類：選擇性₂感受體刺激劑，Terbutaline，ATC 編碼：R03A C03

【適應症】：

支氣管氣喘、支氣管炎及肺氣腫所伴隨之支氣管痙攣之緩解。



【注意事項】：

對擬交感神經胺類敏感的病患；須小心使用。

例如：患甲狀腺機能亢進缺乏適當的控制者。

由於血中葡萄糖會增進 β_2 刺激劑的效用，所以糖尿病患者，於開始使用 Bricanyl 時，須注意血糖的控制。

β_2 -刺激劑已成功地用於治療缺血性心衰竭，但此類藥物亦可能引起不整脈，因此，治療肺疾病患時，須依病情作個別考慮。

使用 β_2 -刺激劑來治療時，可能會造成嚴重的低血鉀症。建議急性氣喘的病患特別注意，因為缺氧會提高相關的危險性。在同時使用 xanthine 類衍生物、類固醇，及利尿劑的情況下，會使低血鉀效應發生的可能性提高，因此建議要同時監測血鉀的濃度。

【孕婦及妊娠投與】

畸胎尚未見於動物及病患，但妊娠三個月以內的婦女，仍須小心投與。Bricanyl 經使用多年，適用於孕婦及產婦，無不良影響之報告，亦不干擾生殖過程。

Terbutaline 雖流注母乳，但醫療劑量對嬰兒無不良影響。

在早產的新生兒中(其母親有使用 β_2 -刺激劑來治療)，有報告指出會有短暫性低血糖的情形。

【副作用】：

依推薦藥量使用，罕有副作用出現，Terbutaline 採吸入治療不致發生嚴重的全身副作用，因進入全身循環之藥物濃度，未達產生全身性作用之量。可能發生之副作用如振顫、頭痛、噁心、痙攣、心跳過速、心悸等，全是擬交感神經興奮性胺類藥物典型的副作用。一旦發生，通常 1 - 2 週內治療後，自然恢復。

就所有 β_2 -刺激劑而言，心律不整(如心房纖維性顫動，心室上心跳過速，心臟之額外收縮)鮮少有被報導。

蕁麻疹和疹病可能會發生。

睡眠障礙和行為障礙(如精神激越、過動、靜止不能)有被報導過。

在罕見的情形下，透過不明的機轉，吸入性藥品可能會造成支氣管痙攣。

【劑量指示】：

本藥須由醫師處方使用。

每一單一劑量 5mg/2ml，一日使用四次，若一次單劑量未用畢，可存於噴霧器之貯存槽，24 小時內仍安定可使用。

【注 意】:

須巡視病人的吸入技巧，每個噴霧器亦應調配以最佳劑量，一旦療效減退，病患須自動與醫師諮詢。

非選擇性的 阻斷劑可能部份甚至完全抑制 - 刺激劑的作用。

包裝：每支 2 公撮單一劑量塑膠瓶裝，100 支以下盒裝。

【修訂日期】:

2007 年 3 月

Bricanyl 是阿斯特捷利康公司的商標

製造廠：AstraZeneca AB

製造廠地址：S-151 85 Södertälje, Sweden

藥 商：臺灣阿斯特捷利康股份有限公司

地 址：台北市敦化南路二段 207 號 21 樓

電話：23782390

09-049-53-0-97-cl